

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan för profylax före exponering (PrEP) för person som ska få PrEP

Detta material innehåller viktig säkerhetsinformation om **Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan** och råd som är avsedda att minimera riskerna med behandlingen.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Utbildningsbroschyr för person som ska få PrEP

Denna broschyr har utvecklats av Mylan och innehåller viktig information om Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv). Materialet är avsett för personer som har förskrivits Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan som profylax före exponering (PrEP).

Denna guide är endast avsedd för information och kompletterar (ersätter inte) bipacksedeln som medföljer ditt läkemedel. För fullständig förteckning över biverkningar och annan viktig information, se bipacksedeln som medföljer i läkemedelsförpackningen. Fråga din vårdgivare om du har några frågor.

Vad är Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan som PrEP?

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan är ett receptbelagt läkemedel som hjälper till att minska risken för hiv-infektion hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre, som väger minst 35 kg), när det används som daglig behandling i kombination med säkert sex.

Vad du behöver veta innan du tar och medan du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan för att minska risken för att infekteras med hiv

- Du måste vara hiv-negativ för att påbörja behandling med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan som PrEP. Emtricitabin/tenofovirdisoproxil kan endast hjälpa till att minska risken för att du får hiv om du tar läkemedlet innan du smittas. Du måste låta testa dig för att säkerställa att du inte redan har hiv. Ta inte Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan för att minska din infektionsrisk om det inte har bekräftats att du är hiv-negativ.
- Berätta för läkaren om eventuella influensaliknande symtom antingen under månaden innan behandling med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan inleds eller när som helst medan du tar emtricitabin/tenofovirdisoproxil. Om du har haft sex som gjort att du riskerat att smittas av hiv kan följande vara tecken på hiv-infektion:
 - trötthet
 - feber
 - led- eller muskelvärk
 - huvudvärk
 - kräkning eller diarré
 - hudutslag
 - nattsvettning
 - förstörade lymfkörtlar i halsen eller ljumsken.

Ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan som din läkare har ordinerat. Sluta inte ta detta läkemedel och undvik att missa några doser. Om du slutar använda detta läkemedel, eller missar doser, kan risken för att du får hiv-infektion öka och du kan utveckla resistens mot behandlingen ifall du blir infekterad med hiv.

- Låt dig testas regelbundet för hiv.
- Om du tror att du har infekterats med hiv, berätta omedelbart för din läkare. Läkaren kan vilja utföra flera tester för att säkerställa att du fortfarande är hiv-negativ.
- Att enbart ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil förhindrar inte att du får hiv. Du måste fortsätta att ha säkert sex medan du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil för att minska risken för att få hiv
 - Använd kondom för att minska kontakten med sädesvätska, vaginalvätskor eller blod och undvik att utsätta dig för andra sexuellt överförbara infektioner.
 - Dela inte personliga artiklar där det kan finnas blod eller kroppsvätskor, t.ex. tandborstar och rakblad.
 - Dela inte eller återanvänd inte nålar eller annan injicerings- eller läkemedelsutrustning.
- Åtgärder för att förbli negativ när du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil som PrEP:
 - Låt dig testas för andra sexuellt överförda infektioner, såsom syfilis och gonorré. Dessa infektioner gör det lättare för dig att infekteras med hiv.
 - Sök information och stöd för att minska sexuellt beteende som kan utsätta dig för en högre risk
- Ta reda på din infektionsstatus för hepatit B-virus (HBV) innan du börjar med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil.

Om du har HBV-infektion kan denna försämrans när du slutar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, dvs. det finns en allvarlig risk för akut leverinflammation.

Hur du tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Ta alltid Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Den rekommenderade dosen för att minska risken för att infekteras med hiv-1 är en tablett Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan dagligen. Alltid när det är möjligt bör Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan tas tillsammans med föda. Ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan varje dag, inte bara då du tror att du har utsatts för risk för hiv-infektion.
- För att hjälpa dig komma ihåg din dos, kan du lägga in en påminnelse i din mobiltelefon eller annan enhet, som dagligen påminner dig när det är dags att ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan.
- Missa inte några doser med Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan eller sluta att ta det om inte din läkare bitt dig att göra det. Att missa doser kan öka risken för att få hiv-infektion. Om du missar en dos av Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan och om du märker det:
 - inom 12 timmar från den tid då du brukar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, ta tablettens så snart som möjligt, helst tillsammans med föda. Ta sedan nästa dos som vanligt.
 - Efter 12 timmar eller mer efter den tid då du brukar ta Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, ignorera den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid den vanliga tiden, helst tillsammans med föda.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Senast granskat av Läkemiddelsverket: 21-Apr-2022

- Om du kräks inom mindre än 1 timme efter att du tagit Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, ta en ny tablett. Du behöver inte ta en ny tablett om du kräks efter mer än 1 timme efter det att du tagit Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För fullständig förteckning över eventuella biverkningar, läs bipacksedeln som medföljer i läkemedelsförpackningen.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive nya eller förvärrade njur- och skelettproblem. Innan och under behandlingen kan din läkare ordinera några blodprov för att mäta njurarnas funktion. Informera din läkare om du tidigare har haft njursjukdomar eller om prover har visat att du har njurproblem. Tala omedelbart om för läkaren om du tror att du har någon av de allvarliga biverkningar som anges i bipacksedeln.

Mycket vanliga biverkningar hos personer som tar Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan omfattar: diarré, kräkningar, illamående, yrsel, huvudvärk, hudutslag och svaghetskänsla.

Tala om för läkaren om du har någon biverkning som stör dig eller inte försvinner.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kan fråga ifall du vill vara delaktig i en studie (kallad Antiretroviral Pregnancy Registry) som övervakar resultatet av kvinnor som tar detta läkemedel under graviditeten.